

Phosphore

Un complément des traitements
des hypophosphatémies et des hypokaliémies

ALIMENT COMPLEMENTAIRE
VACHE



CONSTITUANTS

► Phosphore / (100 g / L)

La carence en Phosphore est souvent impliquée dans les rechutes des d'hypocalcémie. L'apport par voie veineuse n'est actif que pendant 90 minutes, le relai par voie orale est indispensable.

► Potassium / (100 g / L)

En début de lactation, chez les vaches couchées et celles qui baissent en appétit. Lors de changement alimentaire brut et lorsque les fourrages ne sont pas assez riches en Potassium, les apports et la disponibilité du Potassium sont insuffisants et limitent notamment la contractibilité musculaire. L'apport complémentaire par voie orale est alors nécessaire.

► Monopropylène Glycol

Le Propylène Glycol est un précurseur du glucose, il limite les risques de déficit énergétique et permet d'augmenter l'apport énergétique sans risque d'acidose tout en diversifiant en toute sécurité les voies métaboliques.



Espèce ciblée
Vache

Quand l'utiliser

L'hypophosphatémie nécessite un apport complémentaire en phosphore uniquement lorsque la calcémie est normale. Dans ce cas-là l'apport de calcium peut être néfaste. La Kaliémie diminue rapidement lors de baisse ou d'arrêt d'ingestion. Phosphore est conseillé lors de défaut de l'homéostasiephospho-potassique.

Mode d'emploi

Faire avaler lentement 500 ml en s'assurant d'une bonne déglutition.

A renouveler au besoin toutes les 12 heures, 3 fois.

Présentation

Présentoir de 4 flacons de 500 ml

▼ Accédez
au site



▼ Accédez aux
coordonnées de
votre délégués
vétérinaire



04.03.2025

OBIONE.fr



Formations



Pets



Applis



Analyses



UAB



Rurale



Services



Pharma



Outils

OBIONE
des Hommes · des Animaux · une Histoire