



Réduction du risque de cétose Calcium, Rumen et Sorbitol

CétoFlash

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE
RUMINANTS
BIDON DE 5 L

CONSTITUANTS

Monopropylène Glycol	Précurseur énergétique. Active la néoglucogenèse rapidement après ingestion.
Pidolate de Calcium	Augmente fortement l'assimilation du Calcium alimentaire.
Levures	Sécurisent les transitions énergétiques et stabilisent l'équilibre ruminal.
Sorbitol	D'origine végétale, il augmente la mobilisation et le transport des lipides du foie pendant 5 jours. Il est ensuite dégradé dans le rumen et est utilisé comme substrat par la flore ruminale.

23.11.2018

ESPÈCES CIBLÉES ▶

QUAND L'UTILISER ▶

MODE D'EMPLOI ▶

PRÉSENTATION ▶

RUMINANTS

CétoFlash s'utilise autour du vêlage ou lors de risques de cétose, de besoin d'apport en calcium renforcé ou de gestion de risques particuliers : transition alimentaire, perte d'appétit, et métabolisme perturbé.

■ Autour de la mise bas

→ *Gestion du risque de cétose*

Vaches adultes : 500 ml/j pendant 3 à 6 semaines après la mise bas.

Brebis, Chèvres : 100 ml/j pendant 3 à 6 semaines après la mise bas.

→ *Gestion du risque de baisse de production laitière*

Vaches adultes : 250 ml/j pendant 15 jours.

Brebis, Chèvres : 50 ml/j pendant 15 jours.

■ En dehors de la période de mise bas

Vaches adultes : 250 ml/j pendant 4 jours.

Brebis, Chèvres : 50 ml/j pendant 4 jours.

Bidon de 5 L

Obione
Créons ensemble vos solutions

Produits diététiques - Logiciels
Outils de diagnostic - Alimentation
Formations - Audits - Appuis terrain