




Aliment complémentaire diététique

Conditionnement :
Seau de 2,9kg

Mode d'emploi

Diluer 90 g de Rehybione dans 2 L d'eau ou de lait portés à 40°C à distribuer matin et soir pendant 2 jours.

Constituants

Electrolytes

Apports optimisés en sodium, potassium et chlore :

- Pour compenser les pertes digestives en sodium et potassium
- Et obtenir un SID de 75 mmol/L

Diacétate et propionate

Ces 2 Agents alcalinisants permettent :

- De lutter contre l'acidose métabolique (la mortalité des veaux à diarrhée augmente de 25% si le réhydratant oral utilisé ne contient pas d'agents alcalinisants).
- De faciliter l'absorption de l'eau et du sodium dans l'intestin grêle (et donc favorisent la réhydratation).

Ne modifiant pas le pH de l'abomasum, ils ne perturbent pas la coagulation du lait, favorisant ainsi une bonne digestion et une meilleure croissance, à l'inverse du bicarbonate ou du citrate. Il est donc possible de les mélanger au lait pour assurer un apport énergétique satisfaisant.

Le propionate est du plus un composant glucoformateur ; il possède des propriétés bactériostatiques et exerce un effet positif sur l'implantation de certaines souches de lactobacilles.

Lactose et dextrose

L'apport d'énergie sous forme de sucre est indispensable au maintien de la glycémie du veau et à la pénétration des ions potassium dans la cellule. Le lactose est la source naturelle (lait) d'apport d'énergie pour le veau ; il apporte glucose et galactose.

Glucose et dextrose apportent des sucres rapidement assimilables, le galactose étant une source d'énergie plus lente.

La présence de glucose en quantité suffisante améliore considérablement l'absorption intestinale de l'eau et du sodium. Le rapport Glucose/Na est idéalement compris entre 1 et 3 : il est de 2,5 dans REHYBIONE.

REHYBIONE apporte 350kcal/100g. Afin de couvrir les besoins d'entretien, il est recommandé de poursuivre l'alimentation lactée. Si le lait doit être supprimé, ne pas excéder 2 repas.

Glycine

La présence de cet acide aminé dans une solution orale permet d'augmenter l'absorption de l'eau et du sodium.

Les acides aminés peuvent également représenter un apport énergétique (modéré pour la glycine) et peuvent fournir un effet d'épargne protéique en augmentant l'azote aminé disponible.

Le total de la somme du glucose et de la glycine doit être au moins de 150 mmol/L ce qui est le cas pour REHYBIONE.

